

LOG ANTARTIKA

*Dari Rahasia Purba
hingga Perebutan Global*



Oleh **AGUS SUPANGAT**

Log Antartika

Dari Rahasia Purba hingga Perebutan Global

Pengantar

Dalam dunia sains, penerbangan, maritim, dan eksplorasi, kata "**Log**" (berasal dari *logbook* atau catatan log) berarti **catatan resmi yang ditulis secara kronologis (berurutan) mengenai perjalanan, pengamatan, atau peristiwa penting.**

Jika dijabarkan, makna "**Log Antartika**" untuk cerita ilmiahku adalah:

- **Catatan Eksplorasi Ilmiah:** Judul ini memberi kesan bahwa pembaca sedang membuka buku catatan rahasia milik para ilmuwan yang berisi temuan-temuan penting dari waktu ke waktu di benua hitam/putih tersebut.

- **Kronologi Perubahan Benua:** Kata "Log" menggambarkan rangkaian peristiwa yang terekam—mulai dari sejarah masa lalu (struktur purba), kondisi hari ini (gempa dan mencairnya es), hingga prediksi masa depan (perebutan tambang).
- **Kesan Serius dan Menegangkan:** Mirip seperti "Log Kapten" dalam cerita fiksi ilmiah (*Sci-Fi*), judul ini memberikan nuansa dramatis seolah-olah kita sedang memantau sebuah situasi darurat yang sedang berkembang di Antartika.

Secara singkat, **Log Antartika** berarti "Catatan Rekam Jejak dan Rahasia yang Terungkap di Antartika".

Urutan Bagian Cerita:

Bagian 1: Menemukan Struktur Kuno

Para ilmuwan menemukan struktur raksasa berbentuk kipas jauh di bawah lapisan es Antartika Timur.

- **Alasan:** Ini adalah pembuka yang sempurna. Menemukan struktur misterius di dasar benua memicu rasa ingin tahu pembaca tentang sejarah geologi Antartika sebelum kita membahas kondisi ekstremnya saat ini.

Bagian 2: Aktivitas yang Tak Terlihat

Ratusan gempa bumi tersembunyi ditemukan di bawah Antartika — dan gempa-gempa tersebut terjadi di lokasi yang sangat aneh.

- **Alasan:** Setelah mengetahui ada struktur raksasa, cerita berlanjut ke dinamika

internal benua tersebut. Penemuan gempa di lokasi aneh menunjukkan bahwa benua yang terlihat "mati" dan beku ini sebenarnya sangat aktif dan menyimpan rahasia geologis.

Bagian 3: Krisis yang Mulai Tampak

Hilangnya es laut Antartika secara tiba-tiba adalah salah satu peristiwa paling ekstrem dan membingungkan dalam catatan iklim modern. Para ilmuwan sekarang mengetahui mengapa hal itu terjadi.

- **Alasan:** Fokus cerita mulai bergeser dari misteri bawah tanah ke krisis lingkungan di permukaan. Bagian ini menjelaskan pemicu ilmiah mengapa perubahan besar mulai terjadi di Antartika.

Bagian 4: Ancaman yang Mendekat

'Siap hancur': 'Gletser Kiamat' Antartika diperkirakan akan kehilangan lapisan esnya tahun ini.

- Alasan: Ini adalah puncak ketegangan (klimaks) dari sisi sains lingkungan. Efek dari hilangnya es laut membawa dampak nyata dan mendesak: runtuhnya gletser krusial yang bisa menaikkan permukaan air laut global.

Bagian 5: Perebutan di Masa Depan (Konflik Manusia/Penutup)

Antartika menyimpan cadangan emas, perak, tembaga, dan besi dalam jumlah besar. Seiring mencairnya es, negara-negara mungkin akan berlomba untuk menambangnya.

- **Alasan:** Bagian ini berfungsi sebagai penutup yang reflektif sekaligus peringatan (konsekuensi geopolitik). Ketika es mencair akibat krisis di bab sebelumnya, keserakahan manusia dan perebutan sumber daya menjadi babak baru bagi masa depan Antartika.

Alur Singkat Cerita:

Misteri Bawah Es (1) → Aktivitas Geologis Aneh (2) → Krisis Iklim Global (3) → Ancaman Kehancuran Nyata (4) → Perebutan Kekuasaan Manusia (5).

Bagian 1: Menemukan Struktur Kuno

Para ilmuwan menemukan struktur raksasa berbentuk kipas jauh di bawah lapisan es Antartika Timur.

CATATAN EKSPLORASI ILMIAH

Kode Arsip: ANT-EAP/2026

Klasifikasi: Dokumen Temuan Geofisika Skala Benua

Subjek: Provinsi Cekungan Berbentuk Kipas Antartika Timur

I. Pengamatan Fisik dan Struktur Anomali

Jauh di bawah keheningan Lapisan Es Antartika Timur, sebuah struktur geologi raksasa telah terungkap. Bentukan purba ini menyerupai bentangan kipas atau jemari tangan manusia yang terbuka, mencuat dari satu titik pusat yang tetap di kedalaman batuan dasar.

Secara mekanis, struktur ini merupakan manifestasi dari *ekstensi rotasional terdistribusi*—sebuah proses tektonik di mana kerak bumi meregang ke luar secara radial. Celah-celah di antara "jemari" tersebut membentuk serangkaian cekungan segitiga masif yang selama ini dianggap sebagai retakan terpisah. Analisis terbaru menegaskan bahwa seluruh struktur ini adalah satu sistem tunggal yang koheren.

Sistem raksasa ini mengintegrasikan beberapa fitur bawah gletser paling masif di bumi: Cekungan Wilkes, Cekungan Aurora, hingga cekungan dalam yang menampung Danau Vostok.

"Mengenalinya sebesar ini, yang tersembunyi di bawah tiga kilometer lapisan es, adalah hal yang luar biasa. Jika interpretasi ini tepat, kita sedang menyaksikan salah satu contoh ekstensi

rotasional terdistribusi terbesar yang pernah dikenali pada kerak benua."

— **Catatan Lapangan: E. Armadillo**

II. Rekonstruksi Kronologi Tektonik

Penemuan ini memicu peninjauan ulang terhadap garis waktu runtuhnya superbenua purba, Gondwana. Dinamika pembentukan struktur berbentuk kipas ini diperkirakan terikat kuat pada proses geohistoris yang panjang:

- **Fase Pra-Pemisahan (~180 Juta Tahun Lalu):** Pergerakan tektonik awal mulai melemahkan zona batuan di bagian utara benua, menjadi cetak biru bagi keretakan masa depan.
- **Fase Pemisahan Akhir (~70 Juta Tahun Lalu):** Struktur kipas ini memfasilitasi pemisahan akhir antara daratan Antartika

dan Australia pada penghujung Periode Kapur (*Cretaceous*).

- **Fase Pasca-Pemisahan:** Peregangan radial tampaknya terus berlanjut dan meluas bahkan setelah kedua benua tersebut sepenuhnya terisolasi.

Dampak dari deformasi skala benua ini tidak hanya membuka cekungan-cekungan dalam, tetapi juga mengubah topografi purba sekitarnya. Di sisi barat, tekanan tektonik ini berkontribusi pada pengangkatan Pegunungan Gamburtsev—jajaran pegunungan serupa Alpen yang kini terkubur total oleh es. Sementara di sisi timur, propagasi radial dari struktur ini turut memutar dan memecah struktur Pegunungan Transantartika.

III. Dekonstruksi Paradigma Lama dan Implikasi Masa Depan

Selama berdekade-dekade, Antartika Timur kerap dipandang sebagai sebuah kraton yang lamban: wilayah geologi yang tua, dingin, berakar dalam, dan relatif stabil. Data seismik, magnetik, dan gravitasi terbaru ini meruntuhkan asumsi tersebut. Wilayah ini terbukti memiliki sejarah tektonik yang jauh lebih dinamis daripada yang pernah diduga.

Di luar signifikansi sejarah geomorfologinya, struktur purba ini memegang kunci bagi pemodelan masa depan. Topografi batuan dasar dan konfigurasi cekungan yang dibentuk oleh proses tektonik ini merupakan jalur alami bagi aliran es. Memahami arsitektur tersembunyi ini menjadi krusial untuk memprediksi bagaimana Lapisan Es Antartika Timur akan bergerak dan merespons perubahan iklim global.

Lebih dari 99% batuan dasar benua putih ini masih terbungkus rapat oleh es. Penemuan Provinsi Kipas ini tidak menutup sebuah bab penelitian, melainkan membuka lembaran baru yang menegaskan bahwa Antartika masih menyimpan rahasia terdalamnya.

Sumber:

Armadillo, E., Rizzello, D., Balbi, P., Ghirotto, A., Scafidi, D., Paxman, G. J. G., Zunino, A., Ferraccioli, F., Crispini, L., Läufer, A., Lisker, F., Ruppel, A., Morelli, D., & Siegert, M. (2026). A fan-shaped subglacial basin province in East Antarctica formed by rotational extension. *Nature Geoscience*.

<https://doi.org/10.1038/s41561-026-01991-6>

Bagian 2: Aktivitas yang Tak Terlihat

Ratusan gempa bumi tersembunyi ditemukan di bawah Antartika — dan gempa-gempa tersebut terjadi di lokasi yang sangat aneh.

CATATAN EKSPLORASI ILMIAH

Kode Arsip: ANT-EAP/2026

Klasifikasi: Dokumen Temuan Geofisika Skala Benua

Subjek: Rekaman Seismik Tersembunyi di Bawah Gletser David

I. Deteksi Anomali Seismik di Pedalaman Benua

Selama berdekade-dekade, interior Antartika diklasifikasikan sebagai wilayah yang pasif dan sunyi dari aktivitas seismik. Namun, penerapan algoritma pembelajaran mesin (*machine learning*) terhadap basis data seismik dua dekade


terakhir (periode 2001–2004 dan 2012–2015) mematahkan asumsi tersebut. Teknologi ini berhasil mengurai interferensi dan mengungkap lebih dari 500 gempa bumi tersembunyi yang sebelumnya tidak terdeteksi.

Anomali ini tidak hanya terletak pada jumlahnya, melainkan pada lokasinya. Rangkaian gempa ini terkonsentrasi di kedalaman 100 hingga 150 kilometer di bawah Gletser David—sebuah koridor es masif sepanjang 1.100 kilometer yang menghubungkan Antartika Timur dan Barat, serta mengalirkan sekitar 4% volume lapisan es timur ke lautan.

Secara teoritis, gempa pada kedalaman menengah (di atas 80 kilometer) hampir selalu terjadi di batas lempeng aktif atau zona subduksi. Temuan ini mengejutkan karena aktivitas justru terekam di kedalaman mantel atas di pedalaman benua, jauh dari batas lempeng tektonik yang aktif.

"Perangkat pembelajaran mesin yang terus berkembang berpotensi mengungkap bahwa gempa bumi dalam di pedalaman benua jauh lebih umum dari yang diakui saat ini. Jika ini terbukti, peran peristiwa semacam itu dalam kerangka tektonik global harus dievaluasi kembali."

— **Catatan Lapangan: L. Ho**



Gempa bumi dalam terjadi akibat pembengkokan dan pelenturan di perbatasan antara Antartika Timur dan Barat, di bawah Gletser David.

II. Mekanisme Deformasi Bawah Kerak

Analisis data menunjukkan bahwa getaran yang terdeteksi berada pada kisaran magnitudo 1,6 hingga 3,5. Pemicu utama dari aktivitas seismik ini adalah kontras termal dan struktural yang ekstrem di zona transisi bawah gletser:

1. **Zona Pertemuan Massa:** Kerak bumi Antartika Timur yang dingin dan kaku berbenturan langsung dengan mantel atas Antartika Barat yang lebih hangat dan lunak. Perbedaan karakteristik ini memicu perubahan tegangan tektonik secara mendadak.
2. **Pembengkokan Kerak Purba:** Material hangat yang bersifat apung (*buoyant*) dari mantel atas mendesak ke atas melampaui batas bawah Gletser David. Desakan ini mengangkat sekaligus membengkokkan tepian kerak bumi di atasnya. Akumulasi

tekanan akibat pelenturan batuan kaku inilah yang melepaskan getaran seismik secara berkala.

Meskipun aktivitas seismik ini tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mengancam stabilitas lapisan es di atasnya secara langsung, keberadaannya membuktikan bahwa dinamika internal Antartika jauh lebih aktif daripada kalkulasi masa lalu.

III. Arah Penelitian dan Teka-Teki Dinamika Es

Rekaman historis ini menegaskan sebuah realitas fundamental: persepsi mengenai "Antartika yang mati secara seismik" di masa lalu bukanlah cerminan dari kondisi bumi yang sebenarnya, melainkan keterbatasan instrumen deteksi kita pada waktu itu.

Hingga saat ini, sebuah teka-teki ilmiah masih belum terjawab: mengapa aktivitas tektonik kedalaman menengah ini terkonsentrasi sangat padat di bawah Gletser David, dan tidak tersebar merata di sepanjang pegunungan pembatas wilayah tersebut. Hipotesis awal mengarah pada pengaruh erosi gletser jangka panjang atau sejarah fluktuasi volume es yang membebani kerak bumi.

Fokus riset selanjutnya akan diarahkan untuk menguji sejauh mana bobot ekstrem dari Lapisan Es Antartika memengaruhi titik-titik retakan tektonik, serta bagaimana perubahan massa es akibat dinamika iklim global dapat mengubah intensitas aktivitas seismik di bawahnya.

Sumber:

Ho, L. M., Sánchez-Roldán, J. L., Hansen, S. E., & Walter, J. I. (2026). Upper-mantle earthquakes beneath East Antarctica. *Science*, 392(6801), 942–945.

<https://doi.org/10.1126/science.aea9895>

Bagian 3: Krisis yang Mulai Tampak

Hilangnya es laut Antartika secara tiba-tiba adalah salah satu peristiwa paling ekstrem dan membingungkan dalam catatan iklim modern. Para ilmuwan sekarang mengetahui mengapa hal itu terjadi.

CATATAN EKSPLORASI ILMIAH

Kode Arsip: ANT-EAP/2026

Klasifikasi: Dokumen Temuan Oseanografi Fisik dan Iklim Global

Subjek: Kronologi Kolapsnya Lapisan Es Laut Samudra Selatan

I. Anomali 2015: Titik Balik Stabilitas Dekade

Setelah bertahan relatif stabil dari dampak pemanasan global selama berdekade-dekade, es laut Antartika mendadak memasuki fase menyusutan drastis pada tahun 2015. Degradasi

ini mencapai titik nadir terendah dalam sejarah rekaman satelit pada Februari 2023, di mana Antartika kehilangan wilayah es yang lebih luas dari Eropa Barat tepat di puncak musim dingin.

Anomali ini terus bertahan hingga awal tahun 2026, menegaskan bahwa benteng putih tersebut belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Melalui integrasi model numerik hibrida dan data observasi sensor satelit, dinamika di balik runtuhnya pertahanan es laut ini berhasil diurai ke dalam tiga fase kronologis:

"Sistem ini kini berperilaku dengan cara yang sama sekali berbeda. Jelas, ada sesuatu yang telah bergeser secara fundamental dalam keseimbangan benua ini."

— **Catatan Lapangan: A. Narayanan**

II. Rekonstruksi Tiga Fase Destabilisasi Kerapatan Laut

Fase 1: Erosi Lapisan Penahan Bawah Laut (2013–2015)

Selama periode ini, es laut di permukaan tampak meluas karena limpahan air tawar yang dingin di sepanjang tepi benua. Namun, di kedalaman, anomali sedang berjalan lambat. Angin barat belahan bumi selatan (*westerly winds*) menguat akibat melebarnya lubang ozon yang mengintensifkan pusaran kutub (*polar vortex*). Angin kencang ini mendorong air permukaan yang dingin ke utara, memaksa lapisan air dalam yang hangat dan asin naik ke atas. Proses ini perlahan mengikis *Winter Water*—lapisan pelindung tebal ber-suhu rendah yang sejak 2005 telah menipis, yang semula berfungsi sebagai sekat isolasi termal.

Fase 2: Penetrasi Termal dan Destabilisasi Vertikal (2015–2018)

Angin barat semakin terakselerasi, didorong oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Lapisan air dalam yang hangat dan asin akhirnya menembus batas *Winter Water*, mencapai permukaan melalui pencampuran turbulen yang dipicu oleh angin. Panas dari bawah ini memicu pencairan awal es laut secara masif. Keberadaan garam di permukaan melemahkan stratifikasi (pelapisan) alami Samudra Selatan, merusak kerapatan air purba, dan mempermudah massa panas gelombang berikutnya untuk bermigrasi ke atas tanpa hambatan.

Fase 3: Lingkaran Umpan Balik Positif (2018–2023)

Mekanisme pelelehan berubah menjadi proses yang mandiri dan saling memperkuat (*self-reinforcing loop*):

- **Efek Albedo Rendah:** Hilangnya ruang putih es laut membuat Samudra Selatan menyerap lebih banyak radiasi matahari selama musim panas. Akibatnya, laut menyimpan panas berlebih yang harus dilepaskan ke atmosfer terlebih dahulu sebelum es baru bisa terbentuk di musim gugur berikutnya.
- **Krisis Air Tawar:** Karena volume es yang terbentuk di musim dingin menyusut, pasokan air tawar saat siklus mencair di musim panas berkurang drastis. Ketidadaan air tawar ini menjaga lapisan vertikal laut tetap lemah dan membiarkan pencampuran

vertikal massa panas bawah laut terus berlangsung.

III. Proyeksi Transisi Sistem dan Konsekuensi Global

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Samudra Selatan tidak lagi berada dalam kondisi setimbang. Alih-alih merespons sebagai fluktuasi iklim tahunan, bentang es ini terindikasi telah bergeser secara mendadak ke dalam sebuah "keadaan baru" (*new state*) dengan cakupan es laut yang permanen di bawah rata-rata historis 1981–2010.

Dampak dari runtuhnya stabilitas ini meluas melampaui batas kutub:

- **Penyimpanan Karbon Global Terganggu:** Selama 50 tahun terakhir, Samudra Selatan menyerap sekitar 75% panas berlebih bumi. Secara alami,

pembentukan es laut melepaskan garam yang menciptakan arus pekat dan berat untuk tenggelam ke dasar laut, membawa serta panas dan karbon atmosfer ke kedalaman. Menyusutnya es laut melemahkan salinitas permukaan, menghentikan mekanisme tenggelamnya air padat ini, dan membiarkan karbon tetap berada di sistem permukaan.

- **Kerentanan Ekosistem dan Lapisan Es:** Ketiadaan es laut memicu kematian massal koloni penguin serta mengancam keberlangsungan krill sebagai fondasi rantai makanan. Tanpa adanya sabuk pelindung berupa es laut, gletser-gletser utama di daratan Antartika kini terpapar langsung oleh gempuran air laut yang lebih hangat.

Apakah ini sebuah titik kritis keruntuhan total? Belum dapat dipastikan secara absolut. Peningkatan curah hujan dan pasokan air tawar dari pencairan gletser darat akibat perubahan iklim global berpotensi membentuk kembali stratifikasi laut di masa depan. Namun, pergeseran dari dekade es tinggi menuju titik terendah pertengahan 2020-an ini tetap tercatat sebagai salah satu disrupsi iklim terbesar dalam sejarah modern planet Bumi.

Sumber:

Narayanan, A., Ayres, H., England, M. H., Haumann, F. A., Mazloff, M. R., Silvano, A., Spira, T., Zhou, S., & Garabato, A. C. N. (2026). Compound drivers of Antarctic sea ice loss and Southern Ocean destratification. *Science Advances*, 12(19).

<https://doi.org/10.1126/sciadv.aeb0166>

Bagian 4: Ancaman yang Mendekat

'Siap hancur': 'Gletser Kiamat' Antartika diperkirakan akan kehilangan lapisan esnya tahun ini.

CATATAN EKSPLORASI ILMIAH

Kode Arsip: ANT-EAP/2026

Klasifikasi: Dokumen Temuan Geofisika
Kelautan dan Dinamika Kriosfer

Subjek: Keretakan Kritis Lapisan Es Timur
Gletser Thwaites

I. Pemantauan Satelit: Destabilisasi Pilar Utama Antartika Barat

Gletser Thwaites—sungai es raksasa seluas wilayah Florida dengan lebar 120 kilometer dan ketebalan mencapai lebih dari 2.000 meter—kini berada pada fase deformasi paling kritis dalam sejarah pengamatan modern. Sebagai gletser terluas di Bumi, Thwaites berfungsi sebagai pilar penyangga utama yang menahan seluruh massa es Antartika Barat agar tidak merosot ke lautan.

Data citra satelit terbaru mendeteksi bahwa bagian terakhir dari lapisan es (*ice shelf*) bagian timur Thwaites berada di ambang pelepasan total dari tubuh gletser. Meskipun tubuh utama gletser bertumpu di daratan, lapisan es luar ini mengapung di atas permukaan laut dan bertindak sebagai pasak penahan (*buttress*) yang mengunci laju aliran es di belakangnya. Kehilangan pasak

alami ini akan mengonversi perlambatan aliran es menjadi akselerasi langsung ke Samudra Selatan.

Kalkulasi teoritis menunjukkan bahwa keruntuhan total Gletser Thwaites berpotensi menyumbang kenaikan permukaan laut global sebesar 65 sentimeter (2,1 kaki). Lebih jauh, jika seluruh sistem perisai es Antartika Barat ikut runtuh akibat hilangnya Thwaites, permukaan laut global diproyeksikan melonjak hingga 3,3 meter—sebuah manifestasi dari titik kritis iklim (*tipping point*) yang tidak dapat dibalikkan selama ribuan tahun.

"Bagian terakhir dari lapisan es di depan gletser siap untuk hancur. Kita tidak dapat memprediksi fraktur mekanisnya secara presisi, namun keruntuhan struktural ini dipastikan akan terjadi dalam waktu dekat."

— **Catatan Lapangan: R. Larter**

II. Kronologi Erosi Basal dan Dinamika Retakan

Proses pelemahan Gletser Thwaites merupakan akumulasi dari anomali termal bawah laut yang berlangsung sejak dekade 1980-an, menyebabkan penyusutan garis pantai es hingga 20 kilometer sejak tahun 1992. Pengamatan mendalam terhadap struktur internal es mencatat dua fenomena utama:

1. Mekanisme Perambatan Keretakan:

Retakan masif terdeteksi pada titik di mana lapisan es timur bertumpu pada punggung batuan dasar laut (*seafloor ridge*). Dalam rentang waktu delapan bulan terakhir, laju pergeseran es di sisi barat—lokasi awal pelepasan massa es—tercatat melonjak hampir dua kali lipat.

2. Sirkulasi Termal Bawah Es: Kerusakan struktural ini dipicu oleh penetrasi air laut yang lebih hangat dan asin ke bagian dasar (*basal melting*), tepat di zona pertemuan antara es dan batuan dasar laut yang berada di bawah permukaan laut.

Pemodelan numerik menunjukkan bahwa erosi konstan ini akan memaksa Gletser Thwaites kehilangan sekitar 180 miliar hingga 200 miliar ton massa es per tahun secara konsisten pada dekade berikutnya.

III. Korelasi Sirkulasi Atmosfer Atmosferik Belahan Bumi Selatan

Konsensus ilmiah menegaskan bahwa penetrasi massa air hangat ke batuan dasar Antartika Barat erat kaitannya dengan disrupsi sirkulasi makro, bukan sekadar peningkatan suhu permukaan air laut secara lokal.

Perubahan sirkulasi ini digerakkan oleh pergeseran pola angin barat di Belahan Bumi Selatan (*westerly winds*). Angin kencang yang terakselerasi ini mendorong perairan dalam yang hangat dari Samudra Selatan merangsek naik menuju landas benua Antartika. Aktivitas antropogenik yang memicu perubahan iklim global tetap diidentifikasi sebagai penggerak utama di balik anomali angin barat tersebut, mempercepat datangnya krisis di kawasan kutub ini.

Sumber:

Goldberg, D. N., Morlighem, M.,
& Gourmelen, N. (2026). Recent observations of
Thwaites Glacier, West Antarctica are consistent
with high rates of loss in next
50 years. *Geophysical Research Letters*, 53.

<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025GL118823>

Bagian 5: Perebutan di Masa Depan

Antartika menyimpan cadangan emas, perak, tembaga, dan besi dalam jumlah besar. Seiring mencairnya es, negara-negara mungkin akan berlomba untuk menambangnya.

CATATAN EKSPLORASI ILMIAH

Kode Arsip: ANT-EAP/2026

Klasifikasi: Dokumen Proyeksi Geopolitik dan Rekonstruksi Isostatik Benua

Subjek: Analisis Kemunculan Daratan Bebas Es dan Potensi Destabilisasi Hukum Internasional

I. Proyeksi Kriosfer-Geomorfologi 2300: Kebangkitan Lahan Purba

Pemanasan iklim global diproyeksikan akan menyingkap lanskap tersembunyi Antartika—ngarai, lembah, hingga jajaran gunung berapi—ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam

sejarah modern. Melalui integrasi model numerik terbaru, estimasi kemunculan daratan bebas es kini tidak lagi hanya menghitung mundurnya garis batas es (*ice margin*), melainkan melibatkan variabel *penyesuaian isostatik glasial*.

Ketika lapisan es masif seberat miliaran ton menyusut dan mencair, tekanan ekstrem pada litosfer (kerak bumi) akan hilang. Ketiadaan beban ini, dikombinasikan dengan berkurangnya gaya gravitasi lokal dari hilangnya massa es, memicu fenomena penyesuaian di mana daratan batuan dasar di bawahnya perlahan terangkat ke atas (*rebound effect*).

Simulasi komputer memetakan tiga skenario akumulasi daratan baru yang akan mencuat ke permukaan pada tahun 2300:

- **Skenario Pencairan Rendah:**
Memunculkan 149 kilometer persegi daratan baru.

- **Skenario Pencairan Sedang:**
Memunculkan 36.381 kilometer persegi daratan baru.
- **Skenario Pencairan Tinggi:**
Memunculkan hingga 120.610 kilometer persegi daratan bebas es—sebuah wilayah masif yang setara dengan luas negara bagian Pennsylvania.

"Penyusutan volume es dan mundurnya garis dasar telah terekam secara konsisten selama beberapa dekade terakhir. Namun, kalkulasi mengenai pengangkatan daratan pasca-pencairan ini mengubah peta aksesibilitas wilayah kutub secara drastis."

— **Catatan Lapangan: E. Lucas**

II. Pemetaan Metalurgi dan Tumpang Tindih Klaim Teritorial

Singkapan-singkapan daratan baru yang diproyeksikan bebas es pada tahun 2300 menyimpan anomali kekayaan geologis. Di bawah lapisan yang mencair tersebut, terkandung atau diduga kuat terdapat deposit mineral strategis dalam skala masif, termasuk besi, tembaga, emas, perak, dan platinum—komoditas logam mulia dan material kritis yang sangat dibutuhkan oleh sektor manufaktur global.

Secara geografis, akumulasi kemunculan daratan terbesar diprediksi terjadi di sektor Antartika yang berada dalam irisan klaim teritorial tiga negara: Argentina, Chili, dan Inggris Raya. Konvergensi antara kemudahan akses fisik akibat mencairnya es dan tingginya nilai ekonomi deposit mineral di zona sengketa ini menjadi

faktor utama yang berpotensi memicu ketegangan geopolitik baru.

III. Implikasi Hukum Internasional dan Kerangka Tata Kelola Kutub

Saat ini, eksploitasi mineral komersial dilarang mutlak di bawah Protokol Lingkungan Perjanjian Antartika (*Antarctic Treaty System*). Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya mineral hanya dilegalkan jika bermotif murni untuk kepentingan riset ilmiah.

Namun, transformasi struktural benua putih ini diproyeksikan akan memberikan tekanan regulasi yang masif pada kerangka hukum internasional yang ada. Insentif ekonomi dari mineral yang kian mudah diakses berpotensi mendorong negara-negara pengklaim untuk menuntut negosiasi ulang atas pasal-pasal pembatasan tersebut. Jendela hukum pertama untuk

peninjauan kembali protokol ini dijadwalkan terbuka pada tahun 2048.

Meskipun demikian, analisis hukum internasional menunjukkan adanya dua kemungkinan arah transisi:

1. **Tekanan Eksploitasi:** Munculnya desakan kuat untuk mengubah status hukum Antartika dari cagar alam ilmiah menjadi wilayah penambangan komersial global.
2. **Akselerasi Proteksi Lingkungan:** Mengingat medan Antartika akan tetap menjadi salah satu lingkungan paling ekstrem dan berbahaya di Bumi untuk operasi penambangan, krisis ekologis ini justru dapat memicu konsensus baru yang mempererat kerja sama multilateral demi perlindungan total kawasan kutub.

Catatan ini menegaskan bahwa hilangnya es Antartika bukan sekadar krisis iklim lokal, melainkan sebuah peristiwa geografi yang memaksa penulisan ulang peta hukum internasional dan tata kelola global planet Bumi.

Sumber:

Lucas, E. M., Richards, F. D., Cederberg, G., Bao, X., Hoggard, M. J., Tsuji, S. R. J., Latychev, K., Tsuji, L. J. S., & Mitrovica, J. X. (2026). Emergence of Antarctic mineral resources in a warming world. *Nature Climate Change*.

<https://doi.org/10.1038/s41558-026-02569-1>